

Titulo: Estudio sobre las principales comorbilidades clínicas en pacientes con un Síndrome Demencial internados en las salas de un hospital polivalente de agudos

Autores: Dr. Jerry Cesar Bilbao Zarco. Dr. Jorge Gómez Sequeira

Filiación: Asociación de Psiquiatras Argentinos

Introducción

El síndrome demencial es una entidad sindrómica cuya presencia se da debido a que la naturaleza fisiopatológica y etiológica del mismo está en el terreno de conocimiento e intervención de más de un marco teórico de especialidad.

El presente poster intenta develar las principales comorbilidades clínicas de estos pacientes internados en salas de un hospital polivalente de agudos.

Contenido teórico

Síndrome Demencial.

Causas
Psiquiátricas
Neurológicas
Cardiológicas
Endócrinas, metabólicas
Traumáticas
Inmunológicas, oncológicas
Tóxicas y ambientales

Detrimiento de la memoria y atención

Deterioro ocupacional y de la vida relacional

Pobreza en la planificación y ejecución actividades

Perdida del juicio

Etapas de deterioro

Leve	Primeros tres años
Moderada	Dos a diez años
Grave	Entre los ocho y doce años

Datos Estadísticos
Edad de Inicio
65 años
Prevalencia
14% a 24 %
Admisión y consulta
10% a 30%

Objetivos

El objetivo del poster es encontrar la probabilidad de frecuencia entre un potencial síndrome demencial identificado en la evaluación clínica por el dispositivo de interconsulta y el cuadro orgánico de comorbilidad clínica.

Buscando responder a la interrogante de cuál es la comorbilidad orgánica más frecuente en un síndrome demencial, en pacientes internados en un hospital polivalente de agudos.


Métodos

- Base de datos: Revisión de historias clínicas del servicio de interconsulta psiquiátrica y registros estadísticos del servicio. (Período Enero-Marzo 2018)
- Edad de la muestra: Mayores a 65 años.
- Primer criterio de exclusión: Deterioro cognitivo crónico previo a la internación.
- Segundo criterio de exclusión: Deterioro cognitivo crónico evaluable por el seguimiento.

Resultados

El estudio evidencia una franca predominancia de cuadros hipertensivos en este grupo de pacientes, por sobre cualquier otra patología. Tal hecho concuerda con las hipótesis neurobiológicas de la demencia donde se conjuga el hipometabolismo cerebral producto de una hipoperfusión a nivel central propio de la edad, en este caso el aumento de la presión arterial podría verse relacionado como un factor coadyuvante a este fenómeno.

Principales Comorbilidades Clínicas



Conclusiones

El estudio evidencia una franca predominancia de cuadros hipertensivos en este grupo de pacientes, sobre cualquier otra patología. Tal hecho concuerda con las hipótesis neurobiológicas de la demencia donde se conjuga el hipometabolismo cerebral producto de una hipoperfusión a nivel central propio de la edad, en este caso el aumento de la presión arterial podría verse relacionado como un factor coadyuvante a este fenómeno.